© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Tausch-Catalog

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

	Mk.		Mk.
Conchylien von Californien und Oregon.		Pteronotus festivus Hds. C.	1,50-2,80
		Truncatella californica, Pfr.„	0,20-25
Adula falcata, Gld. Calif.	0,50-1,80	„ Stimpsonii, Stearn „	0,20-25
„ stylina. Carp. S. Cruz „	0,40-80	Katherina tunicata, Crp. S. Francisco, „	0,60-1,20
Corbula luteola, Crp. S. Diego Calif.	0,50	Mopalia muscosa, Gld. „	0,50-1
Chione, similima, Sow. „	1,20	„ lignosa Gld. „	1.50-2,50
Donax californicus, Conr. „	0,40	Nuttallina scabra, Rve. „	0,60 80
Machaera patula, Dixon Oreg.	4	Tonicella lineata, Wood „	0,50-80
Meya Hemphilli, Newc. Cal.	0,45-70	Cerithidea sacrata, Gld. „	0,25-35
Platyodon cancellatus Conr. „	2,50-3,50	Conus californicus, Hds. „	0,75-1,50
Schizothoerur Nutalli, Conr.„	3.50-5,50	*Helix*	
Solecurtus californicus „ „	0,60-1,50	arrosa & maxima, Gld. „	0,55-70
Bulla nebulosa, Gld. Diego „	0,50	„ var. Gld. „	0,45-55
Bittium filosum „ „	0,50	ayresiana, Newc. S. Rosa „	0,70-85
„ quadrifilatum Carp. „	0,25	californiensis Lea „	0,40-55
Chlorostoma aureotinctum Forb. Calif.	0,60-1	„ v. vincta „	0,30-55
„ brunneum Phil. „	0,50-80	columbiana, Lea „	0,30-40
„ funebrale, A. Adms. „	0,40-60	„ v. dentata *rara* „	1,50
„ gallina, Forbes „	0,40-70	Dupetithouarsi, Desh. „	0,30-45
Omphalius Pfeifferi Phil. „	0,45-60	exarata, Pfr. & major. „	0,35-50
Zizyphinus annulat. Martyn „	0,60-1,20	„ v. minor. „	0,35-40
„ canaliculatus, Martyn „	0,80-1	facta, Newc. „	0,45-55
„ costatus, Martyn Monter.„	0,40-50	fidelis, Gray Oreg.	0,50-75
Fusus dirus, Rve. Bobinas „	0,80-1,20	infumata, Gld. Calif.	1-1,40
Mya californica Conr. „	0,40-60	Kelletti, Forbes „	0,40-55
Marginella Jewetti, Charp. „	0,30	loricata, Gld. „	0,25-30
Planorbis opercularis, Gld. „	0,25-35	Nickliniana, Lea, Cal. s. f.	0,40
Lacuna unifasciata Crp. „	0,20-25	Stearnsiana, Gabb. Cal.	0,50-60
Monoceros ergonatum, Conr.„	0,40-65	„ var. Calif. infr.	0,60-80
„ lapilloides. Conr. „	0,35-50	Trioni, Newc. „	0,50-80
Macron lividus, A. Ald. „	0,25-50	Townseniana, Lea Idaho	0,70-90
Nacella incessa, Hds. „	0,35-60	Traskii, Newc. C. Ventura „	0,50-80
Nassa fossata, Gld. „	0,80-1,20	tudiculata, Binn. Calif.	0,50-75
„ tegula, Rve. „	0,40-50	„ var. cypreophila, Calaferas Calif. *rara*	1,20
Purpura canaliculata, Ducl. „	0,35-55	mormonum, Pfr. „ „	1-1,20

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.		Mk.
yatesii, Cpr. Cal. *rarissima*	3	havannensis, Pfr., Cuba	0,20
Bridgesii, Newc. Cal.	0,90	lacustris, Müll. Grm., Angl. etc.	0,10
„ var. „	0,90	*Planorbis*	
Pupilla (Pupa) californica, Rowdl. Cal.	0,35	agraulus, Bourgt. Or. alger.	0,20
Zonites Newberryanus, Bin.,	60-1,20	albicans, Pfr. Cuba	0,35
Macrocyclis vancouverensis S. Francisco „	0,50-80	albus, Müll. Germ., Angl. etc.	0,10
„ „ var. maxima „	1-1,20	„ v. lemniscatus, Hartm. Suecia	0,15
Acmaea patina, Esch. Cal.	0,20-30	„ vrs. maximus & Shp. Angl	0,15
„ persona, „ „	0,20-30	bicarinatus, Say Mohawk riv. Newyork	0,20
„ spectrum, Nutt. „	0,20-30	campanulatus, Say Boston	0,20
Myurella simplex, Carp. „	0,30-40	carinatus, Müll. Angl., Carniola etc.	0,15
Olivella biplicata, Swby. „	0,20-30	cinerascens, Rssm., Dalmatia	0,20
Melampus olivaceus, Cpr. „	0,10-20	clathrus, D'Orb. Martinique	0,25
Hyalina inornata, Say Mohawk	0,35-45	Clessinii, Wstrld. Galicia	0,15
NB. Unter den Californiern ist die Verschiedenheit in der Grösse der Individuen und dem Ansehen derselben oft bedeutender, als dies gewöhnlich der Fall ist. — Zwischen dieser Auswahl befinden sich viele Prachtstücke.		complanatus, L. (marginatus, Drp.) Germ., Transsylv. etc.	0,10
Bulimulus		complanatus v. pellucidus, Zgl. Hanau	0,15
sepulchralis, Pocy Cuba	0,30 45	contortus, L. Germ. et Angl.	0,10
fraterculus, Fér. Ind. occ.	0,40-55	„ *rara* Angl. occid.	0,90
? n. sp. In. S. Lorenzo, Peru	0,45	corneus, L. Germ. & Anglia	0,20
? n. sp. Rio Maranhon, Peru orient.	0,45-60	„ var. Transsylv. & Dalm.	0,20
? n. sp. Greytown, Nicaragua	1,20	„ var. albinus *rara* Anglia	0,50
? n. sp. „ „	0,40	„ var. ferrugineus Silesia	0,20
Helix varians Mke. in 15 var.		„ var. minor Transsylv.	0,20
„ Eleuthera, Bahamas	0,30-40	deflectus, Say America bor.	0,20
Grayi, Pfr. N. australia	1,50-2	dispar, Westerlund, Suecia	0,15
Ancylus		Dufouri, Graells Algeria	0,25
abyssinicus, Jickeli, Abyss.	0,20	Eupheus, Bourgt. „	0,15-20
capuloides, Jan. Graecia	0,20	fontanus, Lightfoot Germ.	0,10
fluviatilis, Müll., Germania, Anglia etc.	0,10	glaber, Jeffr. Birmigh. Angl.	0,15
„ var. albus, Jeffr. Halifax „	0,15	guadalupensis, Sow. Portorico	0,25
fragilis Tryon Oregon	0,20	leucostoma, Müll. Germ.	0,15
		lineatus, Walker Angl. orient.	0,15
		„ major. Putney, London	0,20
		lugubris, Wagn. Surinam	0,45

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.
microstomus, Blz. Walachia	0,35
nitidus, Müller Germ. etc.	0,10
occidentalis, Cooper Calif.	0,35
opercularis, Gld. Amer. bor.	0,30
parvus, Say, Boston	0,25
riparius, Westerl. Suecia	0,15
rotundatus, Poiret Berlin	0,10
similis, Bielz Transsylv.	0,20
spirorbis, Müll. Germ., Angl. „	0,10
„ v. major. Suecia	0,15
trivolvis, Say Mohawk riv. New-York	0,22-25
vermiculatus, Gould Calif.	0,15
Villae, Adami Italia s.	0,15
vortex, L. Germ., Angl. etc.	0,10
Physa.	
acuta, Drap. Anglia	0,20
auriculata, Gassies N. Caled.	0,25
cernica, Morel. Mauritius	0,15
convoluta, Parr. Pazo	0,20
costata, Newc. Lac clear, Cal.	0,50
cubensis, Pfr. Cuba	0,35
distinguenda, Coop. Oregon	0,15
fontinalis, L Germ., Angl. etc.	0,10
gyrina, Say Amer. bor.	0,20
„ var. Hildrethiana, Lea Illinois	0,25
guadalupensis, Fischer, Guad.	0,25
heterostropha, Say, N.-York.	0,20
„ var. Nova Scotia	0,20
hypnorum, L. Germ., Angl. etc	0,10
malleata, Coop. Idaho, Amer. bor.	0,25
parvula, Mouss., Ins. Viti	0,25
Sowerbyana, D'Orb. Jamaica	0,25
varicosa, Gassies Na. Caled.	0,30
Isidora contorta, Mich. Algeria & Transsilv.	0,80
Forskalli, Ehrenberg. Abyss.	0,25
sericina, Jickeli „	0,30

	Mk.
Amphipeplea	
glutinosa, Müll. Suecia etc.	0,25
involuta, Harvey Kerry Hib.	0,15-35
Limnaea	
attica, Roth Attica	0,20
auricularia, Drp. Grm. etc. etc.	0,10
„ v. ampla, Hrtm. „	0,15
„ v. intermedia (transitans ad ovata), Mich. Germ. etc.	0,10
caperata, Say Vermont	0,20
catascopium, Say Erie Canal New-York	0,20
cubensis, Pfr. Cuba	0,20-25
elodes, Say Na. Scotia	0,20
elongata, Drp. Angl. & Norveg.	0,20
fragilis, L. (?stagnalis var.) Germania	0,15
fusca, C. Pf. Transsylv.	0,10
gracilis, Say Ohio	0,30-45
longula, Küstr. Bengalore Mysore	0,30
mauritiana, Morel., Maurit.	0,20
minuta, Drp. Germ. Transsylv. etc.	0,10-15
obrussa, Say Amer. bor.	0,20
opaca, Zgl. Hanau, Hassia	0,10
ovata, Drp. lac Boden & Angl.	0,10-15
palustris, Müll. & var. major. Germ. etc.	0,10-15
„ v. conica, Jeffr. Hammersmith, London	0,15
„ v. corva, Gmel. Cheshire	0,15
„ v. decollata, Birmingham	0,15
„ v. elongata, Transsylv.	0,15
„ v. fusca, C. Pfr. Cassel	0,10
peregra, Drp. & varietates multae Germ., Norv., Anglia etc. etc.	0,10
reflexa, Say Illinois u. Indiana	0,20
rosea, v. Gallenstein Carinthia	0,15

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.		Mk.
stagnalis L. Austria, Germau. Hungaria, Norvegia, Suecia Transsylv. etc.	0,15-25	obliqua v. major. New-York	0,30
		oblonga, Drp. Germ. Hung. etc	0,15
		ochracina, Gundl. Cuba	0,35
stagnalis v. bodanica, Cless. lacus Boden	0,25-30	oregonensis, Lea Idaho, Amer. bor.	0,35
„ v. bottnica, Cless. Suecia	0,20	ovalis, Gld. (non Say) Illinois	0,30
„ v. fragilis, J. West. Bromwich Angl.?	0,20	Pfeifferi, Rsm. Germ., Angl. etc	0,10
		pleuraulacea, Letourneux Alg.	0,20
„ v. quadrata, aqua calida Cheshire	0,50	putamen, Gld. Ins. Samoa	0,40
		putris L. & vars. Germ. etc.	0,10
truncatula, Müll. Anglia etc.	0,10	rufovirens, Morion Brasilia	0,35
thermalis, Zgl. Carniolia	0,15	rusticans, Gld. Nevada	0,30
tumida, Held Carinthia	0,20	sagra, D'Orb. Cuba	0,35
umbrosa, Say Vermont	0,25	Sillimani, Blnd. Calif.	0,40
Vahlii, Beck Grönland	0,20	semiserica, Gld. Rangoon	0,35
vulgaris, Rssm. Transsylv. etc	0,15	societatis? Ins. Raiatea	0,35
Succinea		*Amphibulina*	
avara, Say Ohio vera. teste Bland & Binney	0,35	patula, Brug. S. Kitts	0,90
		Simpulopsis	
avara v. minor Maine	0,20	rufovirens, Moricand Brasil.	0,65-80
„ v. Wardiana, Lea. teste Binney	0,30	obtusa, Sowerby „	0,90
		Amphibola	
approximans, Shuttl. Trinidad	0,35	avellana, Chm. Na. Seeland	0,70-95
aurea, Lea. Staten Isl.. N.-Y.	0,35	*Marisa*	
campestris, Say Flor. & Carol.	0,35	cornu arietis, L. I. Trinid.	0,35-50
„ v. inflata, Lea Georgia	0,35	„ var. fasciata „	0,25-40
„ v. Augustin Florida	0,35	*Lanistes*	
candeana, Lea Guadel.	0,35	carinatus, Olivi, Alexandria	0,75
costata, Newc. Calif	0,45	ovum, Peters Mozambique	1,25
crocata, Gould Ins. Samoa	0,35	purpurea, Jonas „	0,85-1
elegans, Risso v. debilis, Morel. Algeria	0,25	*Valvata*	
		californiensis, Mouss. Calif.	0,30
elegans v. longiscata, Morel. Algeria	0,25	contorta, Mnke. Berlin?	0,25
		cristata, Müll. Germ. & Angl.	0,10
grönlandica, Beck Grönland	0,45	macrostoma, Steenstr. Berlin	0,25
gundlachi, Pfr. Cuba	0,35	„ „ Grönl.	0,35
labiata, Pease Ins. Raiatia	0,40	piscinalis, Müll. Germ. & Angl.	0,10
Nuttalliana, Lea. Calif.	0,30	tricarinata, Say Mohawk r. New-York	0,15
obliqua, Say Massachusetts	0,25		

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.
spirorbis, Drp. (cristata var.) Hanau	0,15
Bithynia	
muricata, Drp. Albania	0,10-15
obtusa, Lea Erie Canal	0,10-15
Orsinii, Chrp. Lepante Graecia	0,15
proxima, Frfeld. Hungaria	0,10-15
scalaris, Zgl. Carniolia	0,10
tentaculata, L. & *vars.* Germ., Anglia etc.	0,10-30*
Troscheli, Paasch Potsdm. etc	0,10
sp.? nova? Sicilia	0,10-20*
bulimoides, Olivi Nil	0,25
Leachii, Gray Antwerpen	0,15
similis, Mich. Rostock	0,10
rubens, Mnke. Sicilia	0,10
Hydrobia	
acuta, Drp. Montpellier	0,10*
„ v. dubia Erie Canal N.-Y.	0,10*
baltica, Nilss. litus Oldenburgi, Holstein	0,10*
Brondeli, Bourgt. Tenes., Alg.	0,10
elachista, „ Constantine „	0,10
gagatinella, Prr. Pago Dalmat	0,15*
nana, Tervor Algeria	0,10
oranensis, Brgt. & var. Oran, Algeria	0,15*
similis, Drp. fossis Thamesis Kent	0,30
„ *var. albida* fossis Thamesis Tilbury rara	0,50
stagnalis, Basterot, Spikeroog Oc. germ.	0,10
thermalis, L. Pisano Italien	0,10*
ulvae, Penn. & varietates Anglia etc.	0,10*
ventrosa, Montg. Anglia etc.	0,10*
„ v. baltica Wiesmar	0,10*
ventrosa v. elongata Guernsey	0,10
? sp. St. Jean, Ind. occid.	0,10
anatina, Poiret Bretagne	0,10
australis, D'Orb. Brasilia	0,10-25
baltica, Nilss. vars. de Gallia & Occ. germ.	0,10*
consociella, Frnfld. fl. solona Dalmatia	0,10*
ferruginea, Mnke. Sardinia	0,10
Kutschigi, Küster Dalmat.	0,10
lapidaria, Say Ohio	0,25
muricata, Lam. Albano	0,10
Reissii, Phil. Na. Hollandia	0,25
Succinea, Pfr. Cuba	0,15
Peringia	
pictorum, Palad. Bayonne	0,10*
Dolichia	
Maresi, Bourgt. Algeria	0,20
Amnicola	
anatina, Poir. Montpellier etc.	0,15*
Auberiana, D'Orb. Cuba	0,20
candeana „ Jamaica	0,15
conovula, Parr. Pago, Dalm.	0,15*
coronata, Pfr. Cuba	0,20
Dupotetiana, Forbes Alger.	0,10
limosa, Say (porata Adms.) Nova Scotia	0,20
macrostoma, (Nilss.) Küster Attica	0,10
miliaris, Parr. Dalmatia	0,10
pallida, Haldem Erie Canal, New-York	0,10
porata, Say (Gld.) Amer. bor.	0,15
tritonum, Bourgt. Morea	0,15
? sp. Cardenas, Cuba	0,15
? sp. Insulae Viti	0,20
Paludinella	
aculea, Say (Gould) Boston	0,15

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.		Mk.
austriaca, Frfld. Silesia	0,12*	Sturmii, Rosenh. (?amnicola	
brevis, Mich. Graecia	0,10	St.) Andalusia	0,15
Charpentieri, Roth Arcadia	0,15	viridis, Drp. Gallia australis	0,15*
Conradiella? Carniolia	0,15*	*Lithoglyphus*	
cyclolabris, Rssm. Chrp. „	0,15*	conovulus, Parr. Dalmatia	0,10
cyclostomoides, Neymair,		fluminensis, Lang Carniolia	0,10
Dalmatia	0,15	naticoides, Fér. v. tener	
Dunkeri, Frfld. Biedenkopf,		M. Bielz Banat	0,10
Hassia	0,10*	pannonicus, Frfld. Hungaria	0,10
fontinalis, Kokeil. Carinthia	0,10	pygmaeus „ Dalmatia	0,10
Lacheineri, Chrp. Castel-		*Somatagyrus*	
goffredo, Mantua	0,10*	integer, Say fluv. Ohio	0,15
„ v. alpestris, Villa Styria	0,10	subglobosus, Say Erie Canal	0,15
lata, Frfld. „	0,10*	*Emmericia*	
minutissima, Schm. Carniolia	0,15*	patula, Brumati (= expansi-	
muricata, Nilss. Padua	0,15*	labris, Mühlf.) fluvius	
opaca, Zgl. Carinthia	0,15*	Salona Dalmatia	0,20-25
Parreyssi, Pfr. Cuba	0,20	patula vars. de Carniola &	
psittacina, Schmidt, Carniol.	0,10	Turcia	0,20-25
Schmidtii, Charp. „	0,10*	* Für je 2 Stück.	

Mittheilung.

Da ich eine grössere wissenschaftliche Sammelreise anzutreten gedenke, wodurch meine Rückkunft ungewiss werden dürfte, so habe ich den Tauschverein abgetreten. Derselbe wird unter der Adresse

Linnaea, Brönnerstrasse 30 II., Frankfurt a. M.

ohne Unterbrechung fortgeführt, wohin Tauschanträge und Bestellungen künftig zu richten sind. Ich danke allen geschätzten Mitgliedern für das mir während meiner 4½jährigen Führung des Tauschvereins geschenkte Zutrauen, und werde mir erlauben, gelegentliche Mittheilungen über meine Forschungen im Nachrichtsblatt zu machen.

Hochachtungsvoll

T. A. Verkrüzen.

Bezugnehmend auf obige Mittheilung bittet die ***Linnaea*** um recht zahlreiche Aufträge. Besonders erwünscht sind Offerten von Mollusken von sicheren Fundorten zum Tausch oder Ankauf.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.
Verlag von Alt & Neumann in Frankfurt a. M.